ref: 75.09.034rev.02
2014

Strada Regina
6877-6874 Castel San Pietro - Switzerland
Phone : +41 91 696 60 60 Fax +41 91 696 60 66
info@medacta.ch – www.medacta.com

CE 0476

Mecta-C - Anterior Cervical Plates System Manufactured by:
Mecta-C - Sistema de placas cervicales anteriores Medacta International s.r.l.
Mecta-C - Système Plaques cervicales antérieures CH-6874 Castel San Pietro
Mecta-C - anteriorer halswirbelplatten System
Mecta-C - Sistema de placas cervical anterior
Mecta-C - Sistema Placas Cervicales Anteriores
Mecta-C - Sistemi di Placche Cervicali Anteriori

CAUTION

For a US specific package insert, please go to www.medacta.com or call toll free 800-901-7836

SYMBOLS / SYMBOLE / SYMBOLS / SIMBOLOS / SÍMBOLOS / SIMBOLI

	Do not reuse / Nicht zur Wiederverwendung / Ne pas réutiliser / Niet opnieuw gebruiken / No reutilizar / Não re-utilizar / Non riutilizare
	Do not resterilize / Nur einmal sterilisierbar / Ne pas restériliser / Niet opnieuw steriliseren / No resterilizar / Não re-esterilizar / Non risterilizzare
	Caution, read the accompanying documents / Achtung, bitte Begleitdokumente beachten / Let op, lees de bijbehorende documentatie / Attention, lire les documents d'accompagnement / Advertencia: consulte los documentos que acompañan / Cuidado, consultar documentos / Attenzione, leggere i documenti di accompagnamento
	Consult instructions for use / Anwendungsvorschrift beachten / Consulter les instructions d'utilisation / Raadpleeg de gebruiksinstructies / Consulte las instrucciones de uso / Consultar as intruções de uso / Consultare le istruzioni per l'uso
	Do not expose to sunlight / Vor Sonnenlicht schützen / Ne pas exposer au soleil / Niet blootstellen aan zonlicht / No exponer a la luz del sol / Não expor à luz solar / Non esporre alla luce solare
	Store in a dry place / Trocken aufbewahren / Conserver dans un endroit sec / Op een droge plaats bewaren / Almacenar en un lugar seco / Armazenar em local seco / Conservare in luogo asciutto
	Do not use if packaging is damaged / Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist / Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé / Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd / No utilizar si el envase está dañado / Não usar se a caixa de acondicionamento se encontrar danificada / Non usare se la confezione è danneggiata
	Use by / Te gebruiken voor / A utiliser avant / Zu verwenden bis / Utilizar antes de / A utilizzare entro
LOT	Lot number / Lotnummer / Numéro de lot / Partijnummer / Número de lote / Número de lote / Numero di lotto
REF	Reference number / Referenznummer / Numéro de référence / Referentienummer / Número de referencia / Número de referência / Numero di riferimento
STERILE EO	Sterilized with ethylene oxide / Mit Ethylenoxid sterilisiert / Stérilisé à l'oxyde d'éthylène / Gesteriliseerd met ethyleenoxide / Esterilizado con óxido de etileno / Esterilizado com óxido de etileno / Sterilizzato con ossido di etilene
STERILE R	Sterilized by irradiation / Sterilisiert durch Bestrahlung / Stérilisé par irradiation / Gesteriliseerd door doorstraling / Esterilizado por irradiación / Esterilizado por irradiação / Sterilizzato mediante irradiazione

ENGLISH — Mecta-C - Anterior Cervical Plates System - Instructions for use

GENERAL INFORMATION

Before any surgery, the surgeon must be familiar with the sales literature and operative technique and must carefully read these instructions for use. Patient selection is as important as implant placement and positioning. Obesity or unsuitable functional requirements may contraindicate surgery. Additional considerations are: Patients who are unwilling to follow instructions or who, for any reason, are unable for use must be strictly followed. Obesity or unsuitable functional requirements may generate exceptional stresses and reduce the implant life. The warnings must be heeded, and the indications for use must be strictly followed.

INTENDED USE

The Mecta-C Anterior Cervical Plate System components are intended for anterior interbody screw/plate fixation of the cervical spine during the development of a cervical spinal fusion

PRODUCT DESCRIPTION

The Mecta-C Anterior Cervical Plate System consists of a variety of shapes and sizes of bone plates, screws, and associated instruments. Fixation is provided by bone screws inserted into the vertebral body of the cervical spine using an anterior approach. The Mecta-C Anterior Cervical Plate System implant components are made from titanium alloy. Do not use any of the Mecta-C Anterior Cervical Plate System components with the components from any other system or manufacturer. All the implants are intended for single-use only.

INDICATION FOR USE

The Mecta-C plate system is intended for anterior Interbody screw/plate fixation from C2 to T1. The indications and contraindications of spinal instrumentation systems should be well understood by the surgeon. The system is indicated for use in the temporary stabilization of the anterior column from the development (or re-establishment) of bony fusion in patients with (1) degenerative disc disease (as defined by neck pain of discogenic origin with degeneration of the disc confirmed by history and radiographic studies), 2) trauma (including fractures), 3) tumors, 4) deformity (defined as kyphosis, lordosis or scoliosis), 5) pseudarthrosis, and/or 6) failed previous fusion.

This device system is intended for anterior cervical intervertebral body fusions only.

CONTRAINDICATIONS

This device is not approved for screw attachment to the posterior elements (pedicles) of the cervical, thoracic, or lumbar spine. Contraindications include but are not limited to:

1. Infection, local to the operative site.
2. Signs of local inflammation.
3. Fever or leukocytosis.
4. Morbid obesity.
5. Pregnancy.
6. Mental illness.
7. Any medical or surgical condition which would preclude the potential benefit of spinal implant surgery, such as the elevation of sedimentation rate unexplained by other diseases, elevation of white blood count (WBC), or a marked left shift in the WBC differential count.
8. Rapid joint disease, bone absorption, osteopenia, and/or osteoporosis. Osteoporosis is a relative contraindication since this condition may limit the degree of obtainable fixation and may increase the risk of mechanical failure, and/or the quality of bone graft.
9. Suspected or documented metal allergy or intolerance.
10. Any case not needing a bone graft and where fracture healing is not required.
11. Any case requiring the mixing of metals from different components.
12. Any patient having inadequate tissue coverage over the operative site or where there is inadequate bone stock, bone quality, or anatomical definition.
13. Any case not described in the Indications.
14. Any patient unwilling to cooperate in the post-operative instructions.
15. Any time implant utilization would interfere with anatomical structures or expected physiological performance.

WARNINGS

A successful result is not always achieved in every surgical case. This fact is especially true in spinal surgery where many supervening circumstances may materially impair the normal healing process. The Mecta-C Anterior Cervical Plate System is a temporary implant used for the correction and stabilization of the spine. This system is also intended to be used to augment the development of a spinal fusion by providing temporary stabilization. This device system is not intended to be the sole means of spinal support. Bone grafting must be part of the spinal fusion procedure in which the Mecta-C Anterior Cervical Plate System is utilized. This system is utilized to obtain fixation until the spine is fused. Do not bend or cut the implant. Do not develop into a non-union will not be successful. This spinal implant cannot withstand body loads without the support of bone. In this event, bending, loosening, disassembly and/or breakage of the implant will occur. The size, design and mechanical properties of spinal implants are critical to the successful use. Knowledge of surgical techniques, proper reduction, and proper selection and placement of the implant are important considerations in the successful utilization of the Mecta-C Anterior Cervical Plate by the surgeon. Further, the proper selection and compliance of the patient will greatly affect the results. Patients who smoke have been shown to have an increased incidence of non-unions. These patients should be advised of this fact and warned of this consequence. Obese, malnourished, and/or alcohol and/or other drug abuse patients are also poor risks. Loosening, bending, and breakage will occur more often in these patients if they do not comply with strict postoperative directions and also not good candidates for spine fusion.

POSSIBLE ADVERSE EFFECTS

Adverse effects associated with the use of any orthopaedic implant can be:
Potential adverse events include, but are not limited to:

1. Early or late loosening of any or all components.
2. Disassembly, bending, wear, deformation or migration of the implants.
3. Foreign body (allergic) reaction to implants, debris, corrosion products, graft material, including metallosis, staining, tumor formation, and/or elevation of blood metal ion levels.
4. Pressure on the skin from component parts in patients with inadequate tissue coverage over the implant possibly causing skin penetration, infection, and/or pain. Bursitis. Tissue damage caused by improper positioning and placement of implants or instruments.
5. Post-operative change in spinal curvature, loss of correction, height and/or reduction in overall spine length.
6. Infection.
7. Dural tears.
8. Loss of neurological function, including paralysis (complete or incomplete), dysesthesias, hyperesthesia, anesthesia, paraesthesia, appearance of radiculopathy, and/or the development or continuation of pain, numbness, neuroma, or tingling sensation.
9. Neuropathy, neurological deficits (transient or permanent), bilateral paraplegia, reflex deficits, and/or arachnoiditis.
10. Loss of bowel and/or bladder control or other types of urogenital disturbances.
11. Scar formation possibly causing neurological compromise around nerves and/or pain.
12. Fracture, resorption, microfracture, or penetration of any spinal bone and/or bone graft or bone harvest site at, above, and/or below the level of surgery.
13. Interference with roentgenographic, CT, and/or MRI imaging because of the presence of the implants.
14. Non-union (pseudarthrosis), fatigue fracture, and/or breakage.
15. Cessation of any potential growth of the operated portion of the spine. Loss of spinal mobility or function. Inability to perform the activities of daily living.
16. Bone loss or decrease in bone density, possibly caused by stress shielding.
17. Graft donor site complications including pain, infection, fracture, and/or wound healing problems.
18. Atelectasis, ileus, gastritis, herniated nucleus pulposus, retropulsed graft.
19. Hemorrhage, hematoma, seroma, embolism, edema, stroke, excessive bleeding, phlebitis, wound necrosis, wound dehiscence, or damage to blood vessels.
20. Gastrointestinal and/or reproductive system compromise, including sterility and loss of consortium.
21. Developmental disorders in children, including amputation, bone growth disorders, and/or death.
22. Change in mental status.
23. Death.

Additional surgery may be necessary to correct some of these anticipated adverse events.

INSTRUCTION FOR USE

IMPLANT SELECTION

The selection of the proper size, shape and design of the implant for each patient is crucial to the success of the procedure. Metallic surgical implants are subject to repeated stresses in use, and their strength is limited by the need to adapt the design to the size and shape of human bones. Unless great care is taken in patient selection, proper placement of the implant, and postoperative management, the stresses over the implant will cause it to bend, break, or loosen. Bending and breakage will occur before healing, bending or loosening of the device before the healing process is complete, which may result in further injury or the need to remove the device prematurely.

IMPLANT FIXATION

Installation and positional adjustment of implants must only be done with special ancillary instruments and equipment supplied and designated by MEDACTA. In the interests of patient safety it is therefore recommended that MEDACTA implants are not used with implants from any other system or manufacturer.

PREOPERATIVE

1. Only patients that meet the criteria described in the indications should be selected.
2. Patient conditions and/or predisposing factors of the aforementioned contraindications should be avoided.
3. Care should be used in the handling and storage of the implant components. The implants should not be scratched or otherwise damaged. Implants and instruments should be protected during storage especially from corrosive environments.
4. The type of construct to be assembled for the case should be determined prior to beginning the surgery. An adequate inventory of implants should be on hand at the time of surgery, including implants larger and smaller than those expected to be used.
5. Since mechanical parts are involved, the implant should be new, not previously implanted. Previously used implants from the equipment and should personally assemble the devices to verify that all parts and necessary instruments are present before the surgery begins. The Mecta-C Anterior Cervical Plate System components are not to be combined with the components from another manufacturer. Different metal types should not be used together.
6. All the instruments and the related components should be cleaned and sterilized before use. Additional sterile components should be available in case of an unexpected need.

INTRAOPERATIVE

1. Any instruction manuals should be carefully followed.
2. At all times, adequate distraction must be used to protect the spinal cord and nerve roots. Damage to nerves will cause loss of neurological functions.
3. When the configuration of the bone cannot be fitted with an available temporary internal fixation device, and contouring is absolutely necessary, it is recommended that such contouring be gradual and great care be used to avoid notching or scratching the surface of the device(s). The components should not be repeatedly or excessively bent any more than absolutely necessary. The components should not be reverse bent at the same location.
4. The implant surfaces should not be scratched or notched, since such actions may reduce the functional strength of the construct.
5. Bone grafts must be placed in the area to be fused and the graft must be extended from the upper to the lower vertebrae to be fused.
6. Bone cement should not be used since this material will make removal of the components difficult or impossible. The heat generated from the curing process may cause neurological damage and bone necrosis.
7. Before closing the soft tissues, all of the screws should be seated onto the plate. Recheck the tightness of all screws after finishing to make sure that none has loosened during the tightening of the other screws. Also secure the locking screw into place to cover the portion of the screw heads which are located at the ends of the plate. Failure to do so may result in screw loosening.

Caution: Excessive torque on the threads may cause the threads to strip in the bone, reducing fixation.

POSTOPERATIVE

The physician's postoperative directions and warnings to the patient and the corresponding patient compliance, are extremely important.

1. Detailed instructions on the use and limitations of the device should be given to the patient. If partial weight-bearing is recommended or required prior to firm bony union, the patient must be warned that bending, loosening or breakage of the components are complications which can occur as a result of excessive or early weight-bearing or excessive muscular activity. The risk of bending, loosening, or breakage of a temporary internal fixation device during postoperative rehabilitation may be increased if the patient is active, or if the patient is debilitated, demented or otherwise unable to use crutches or other weight supporting devices. The patient should be warned that bending or breakage of a device is a cause for concern.
2. To allow the maximum chances for a successful surgical result: the patient or device should not be exposed to mechanical vibrations that may loosen the device construct. The patient should be warned of this possibility and instructed to limit and restrict physical activities and avoid any type of sport participation. The patient should be cautioned that the device could be advised not to smoke or consume alcohol during the bone graft healing process.
3. The patient should be advised of their inability to twist at the point of spinal fusion and taught to compensate for this permanent physical restriction in body motion.
4. If a non-union should occur or if the components loosen, bend, and/or break, the device(s) should be revised and/or removed immediately before serious injury occurs. Failure to immobilize a delayed or non-union of bone will result in excessive and repeated stresses to the implant. The resultant fatigue failure of the implant is a frequent sequel to nonunion and/or breakage of the device(s). It is important that immobilization of the spinal spinal site be maintained until firm bony union is established and confirmed by roentgenographic examination. The patient must be adequately warned of these hazards and closely supervised postoperatively to minimize these hazards.

The MECTA-C Anterior Cervical Plate System implants are temporary internal fixation devices. Internal fixation devices are designed to stabilize the anterior column from the development of bony fusion. After the spine is fused, the device(s) serve no functional purpose and should be removed. In most patients removal is indicated because the implants are not intended to transfer or support long-term unbridled loads across a healed bone. If the device is not removed following completion of the intended use, one or more of the following complications may occur: (1) Corrosion, with localized tissue reaction or pain, (2) Migration of implant possibly resulting in pain, (3) Risk of additional injury from post-operative trauma, (4) Bending, loosening and/or breakage, which could make removal impractical or difficult, (5) Pain, discomfort, or abnormal sensations due to the presence of the device, (6) Possible increased risk of infection, and (7) Bone loss due to stress shielding. While the surgeon must make the final decision, the following are all indications of the need for removal: Surgical Manufacturers Association that whenever possible and practical for the individual patient, bone fixation devices should be removed once their service as an aid to healing is accomplished. Exceptions are: Fracture fixation devices in patients, the surgeon should take into consideration the potential risk to the patient of a second surgical procedure and the difficulty of removal. Implant removal, should be followed by adequate postoperative management to prevent refracture.

Any retrieved devices should be treated in such a manner that reuse in another surgical procedure is not possible. As with all orthopaedic implants, none of the Mecta-C Anterior Cervical Plate System components should ever be reused under any circumstances.

PACKAGING

Packages for each of the components should be intact upon receipt. If a loaner or consignment system is used, all sets should be carefully checked to ensure that all components are present and undamaged before use. Implants should not be used if there is no damage prior to use. Damaged packages or products should not be used, and should be returned to Medacta International or to the distributor from which they were received.

Mecta-C Plate and screws are available in sterile packaging.

The sterilization method is indicated on the label. The expiration date must be checked on the label as well as the package integrity to ensure that sterility of the contents has not been compromised. If a package is damaged or has been previously opened, do not use the implant.

If a loaner or consignment system is used, all sets should be carefully checked for completeness and all implants and instruments should be carefully checked to ensure that there is no damage prior to use. Damaged packages or products should not be used and should be returned to Medacta.

The packages must be stored in a cool, dry place, not exposed to sunlight.

PRODUCT COMPLAINTS

Any healthcare professional, hospital customer or user of this system of product(s) who has any complaints or who has experienced any dissatisfaction in the product quality, identity, durability, reliability, safety, effectiveness and / or performance should notify MEDACTA or the distributor. Furthermore, if any of the implanted spinal system implant(s) ever malfunction (ie does not meet any of its performances) or based upon any design, material, or workmanship (eg, the device breaks, bends, or fractures) the device should be notified immediately. If any MEDACTA product ever malfunctions and may have caused or contributed to the death or serious injury of a patient, MEDACTA should be notified immediately by telephone, fax or written correspondence within 24 hours. For such a complaint, please provide the implant(s) name and number, lot number(s), your name and address, the nature of the complaint and notification of whether a written report from the distributor is requested.

FURTHER INFORMATION

Recommended directions for use of this system (surgical operative techniques) are available at no charge upon request. If further information is needed or required, please contact MEDACTA.

The reference test is the English test. Last update: August 2014

DEUTSCH — Mecta-C - Anterior zervikale Platten System - Gebrauchsanweisung

ALLGEMEINES

Vor jeder Operation muss der Chirurg mit der Literatur und Operationstechniken vertraut sein sowie diese Gebrauchsanweisungen sorgfältig lesen. Die Patientenauswahl ist ebenso wichtig, wie die Platzierung und Positionierung des Implantats. Fettleibigkeit oder ungeeignete funktionale Anforderungen können außergewöhnliche Belastungen darstellen und die Lebensdauer des Implantats verkürzen. Diese Hinweise müssen beachtet und die Gebrauchsanweisungen müssen strikt befolgt werden. Fettleibigkeit oder ungeeignete funktionale Anforderungen können außergewöhnliche Belastungen darstellen und die Lebensdauer des Implantats reduzieren. Diese Warnungen müssen beachtet und die Gebrauchsanweisungen müssen strikt befolgt werden.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE NUTZUNG

Die Komponenten des anterioren zervikalen Plattensystem Mecta-C sind für die anteriore interkorporelle Schrauben-/Plattenfixierung der Halswirbelsäule während einer zervikalen Fusionsoperation vorgesehen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das anteriore zervikale Plattensystem Mecta-C besteht aus einer Auswahl von Knochenplatten in unterschiedlichen Formen und Größen, Schrauben und zugehörigen Instrumenten. Die Fixation erfolgt mittels Knochenschrauben, die mit einem anterioren Ansatz in den Wirbelkörper der Halswirbelsäule eingesetzt werden. Die Implantatkomponenten des anterioren zervikalen Plattensystems Mecta-C bestehen aus einer Titanlegierung. Verwenden sie keine Komponenten des anterioren zervikalen Plattensystems Mecta-C mit den Komponenten jeglicher anderer Systeme oder Hersteller. Sämtliche Implantate sind für den einmaligen Einsatz bestimmt.

INDIKATIONEN

Das Plattensystem Mecta-C ist für die anteriore interkorporelle Schrauben-Plattenfixation von C2 bis T1 vorgesehen. Der Chirurg muss über umfassende Kenntnisse der Indikationen und Kontraindikationen spinaler Instrumentationssysteme verfügen. Das System ist vorgesehen für die temporäre Stabilisierung der anterioren Wirbelsäule während einer zervikalen Spinalfusion bei Patienten mit: 1) degenerativer Bandscheibenerkrankung (definiert durch Nackenschmerzen diskogenen Ursprungs mit Degeneration der Bandscheibe, bestätigt durch Krankengeschichte und radiologische Untersuchungen), 2) Trauma (inklusive Frakturen), 3) Tumor, 4) Deformation (definiert als Kyphose, Lordose oder Skoliose), 5) Pseudarthrose und/oder erfolgloser vorheriger Fusion.

Dieses Implantatsystem ist ausschließlich für anteriore zervikale Intervertebralkörperfusionen vorgesehen.

KONTRAINDIKATIONEN

Mecta-C Platte System ist nicht für die Anbringung an posterioren Elementen (Pedikel) der Hals-, Brust- oder Lendenwirbelsäule zugelassen. Die Kontraindikationen umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf:

1. Infektionen, lokal im Operationsbereich.
2. Anzeichen lokaler Entzündungen.
3. Fieber oder Leukozytose.
4. Krankhafte Fettleibigkeit.
5. Schwangerschaft.
6. Psychische Erkrankungen.
7. Jeden medizinischen oder chirurgischen Bedingungen, welche einen potenziellen Nutzen der Implantatoperation ausschließen, wie eine Erhöhung der Sedimentationsrate, die nicht durch andere Krankheiten erklärbar ist, eine Erhöhung der Leukozytenzahl (WBC) oder eine ausgeprägte Linksverschiebung im Differenzialblutbild.
8. Schnell voranschreitende Gelenkerkrankung, Knochenresorption, Osteopenie und/oder Osteoporose. Osteoporose ist eine relative Kontraindikation, da diese den Grad der erreichbaren Fixation begrenzen und das Risiko mechanischer Fixationen und/oder die Qualität des Knochentransplantats begrenzt.
9. Vermutete oder dokumentierte Metallallergie oder -intoleranz.
10. Jeder Fall, in dem ein Knochentransplantat und eine Fusion nicht benötigt werden oder das Heilen einer Fraktur nicht erforderlich ist.
11. Jeder Fall, in dem das Mischen von Metallen unterschiedlicher Komponenten erforderlich ist.
12. Jeder Patient mit unzureichender Weichteilabdeckung über dem Operationsbereich oder eine unzureichenden Knochensubstanz, Knochenqualität oder anatomischen Struktur.
13. Jeder nicht in den Indikationen beschriebene Fall.
14. Jeder Patient, der nicht bereit ist, an der postoperativen Anweisungen zu halten.
15. Jeder Fall, in dem die Verwendung des Implantats mit anatomischen Strukturen oder der erwarteten physiologischen Leistungsfähigkeit in Konflikt geraten könnte.

WARNUNGEN

Nicht bei jedem chirurgischen Eingriff wird ein erfolgreiches Resultat erzielt. Dies gilt besonders für die spinale Chirurgie, wo mehrere Umstände die Heilungsprozesse beeinträchtigen können. Das anterioren zervikalen Plattensystem Mecta-C ist ein temporäres Implantat zur Korrektur und Stabilisierung der Wirbelsäule. Dieses System ist ebenfalls zur Unterstützung einer spinalen Fusion durch temporäre Stabilisierung vorgesehen. Dieses Vorrichtungssystem ist nicht als einziges Hilfsmittel zur Wirbelsäulen zur Unterstützung der Wirbelsäule vorgesehen. Knochentransplantate müssen Teil eines spinalen Fusionsvorgangs sein, bei dem das anteriores zervikale Plattensystem Mecta-C eingesetzt wird. Der Einsatz dieses Produkts ohne Knochentransplantat führt zu Fehlern, die eine Reoperation erforderlich machen. Das Implantat darf nicht gebogen oder geschnitten werden. Die Heilung des Knochens ohne die Unterstützung durch Knochen nicht tragen. In diesem Fall kommt es letztlich zu einem Verbiegen, Lockern, Zerbrechen oder Brechen einer temporären internen Fixationsvorrichtung während der postoperativen Rehabilitation kann erhöhen. Ist der Patient aktiv, gebrechlich, dement oder aus anderen Gründen nicht in der Lage mit Krücken oder anderen Gehhilfen zu laufen, sollte der Patient gewarnt werden, dass ein Verbiegen oder Brechen der Vorrichtung eine Komplikation darstellen kann. Der Patient muss vor der Gefahr von Stürzen gewarnt werden.

PACKUNG

Packungen für each of the components should be intact upon receipt. If a loaner or consignment system is used, all sets should be carefully checked to ensure that all components are present and undamaged before use. Implants should not be used if there is no damage prior to use. Damaged packages or products should not be used, and should be returned to Medacta International or to the distributor from which they were received.

Mecta-C Platte und Schrauben are available in sterile packaging.

Die Sterilisationsmethode ist auf dem Etikett angegeben. Das Verfallsdatum auf dem Etikett und die Packungsintegrität müssen überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine Verunreinigung der Sterilität des Inhalts vorliegt. Implantat nicht verwenden, wenn die Packung beschädigt ist oder bereits geöffnet wurde.

Wenn ein Leih- oder Konsignationssystem verwendet wird, müssen vor der Verwendung sorgfältig auf Vollständigkeit und Unversehrtheit aller Komponenten überprüft werden. Implantate und Instrumente müssen vor der Verwendung auf Medacta International oder den lokalen Distributor zurückgegeben werden. Mecta-C Platten und Schrauben sind steril verpackt erhältlich. Die Sterilisationsmethode ist auf dem Etikett angegeben. Das Verfallsdatum auf dem Etikett und die Packungsintegrität müssen überprüft werden, um sicherzustellen, dass die Sterilität des Inhalts nicht beeinträchtigt ist. Verwenden Sie das Implantat nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist oder bereits geöffnet wurde. Sollte ein beteiligtes Produkt oder MEDACTA jemals eine Fehlfunktion aufweisen oder zum Tod oder ernsthaften Verletzungen eines Patienten beigetragen haben, muss der Distributor umgehend telefonisch, per Fax oder schriftlich davon in Kenntnis gesetzt werden. Wenn Sie eine Beschwerde einreichen, geben Sie bitte den Namen und die Nummer(n) des Implantats, Ihren Namen und Ihre Adresse sowie die Art der Beanstandung an und informieren Sie uns, ob ein schriftlicher Bericht des Distributors erforderlich ist.

WEITERE INFORMATIONEN

Empfohlene Gebrauchsanweisungen für dieses System (chirurgische Operationstechniken) sind kostenlos auf Anfrage erhältlich. Wenn weitere Informationen gewünscht oder erforderlich sind, kontaktieren Sie bitte MEDACTA.

Der Referenztext ist der englische Text. Letzte Aktualisierung: August 2014

FRANCAIS — Mecta-C - Système Plaques cervicales antérieures - Mode d'emploi

GENERALITES

Avant toute intervention, le chirurgien doit bien connaître la documentation commerciale et la technique opératoire, ainsi avoir lu attentivement le présent mode d'emploi. Le choix du patient est aussi important que la mise en place et le positionnement de l'implant. L'obésité ou des exigences fonctionnelles incompatibles peuvent entraîner des contre-indications exceptionnelles à réaliser la durée de vie de l'implant. Les notices d'avertissement doivent être prises en compte et le mode d'emploi doit être strictement respecté. L'obésité ou des exigences fonctionnelles incompatibles peuvent entraîner des contraintes exceptionnelles réduire la durée de vie de l'implant. Les notices d'avertissement doivent être prises en compte et le mode d'emploi doit être strictement respecté.

UTILISATION PREVUE

Les éléments du système Mecta-C sont destinés à la fixation intersomatique par voie antérieure d'une plaque et de vis sur la colonne cervicale pendant la période de développement d'une fusion de cette colonne.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le système de plaques cervicales par voie antérieure Mecta-C comprend des plaques viséées et des vis de différentes formes et tailles, fournies avec les instruments associés. La fixation est assurée par les vis, que l'on insère dans le corps vertébral de la colonne cervicale en utilisant une approche antérieure. Les pièces d'implant du système de plaques cervicales par voie antérieure Mecta-C sont en alliage de titane. Ne pas les utiliser avec celles d'un autre système ou d'un autre fabricant. Chaque implant ne doit être utilisé qu'une seule fois.

INDICATION D'EMPLOI

Le système de plaques Mecta-C est destiné à la fixation intersomatique par voie antérieure d'une plaque et de vis entre C2 et T1. Les indications et contre-indications des systèmes d'instrumentation destinés à la colonne cervicale doivent être bien comprises

5. Comme des pièces mécaniques sont présentes, le chirurgien doit se familiariser avec les différents éléments avant l'utilisation du matériel. Les composants ne doivent pas être mélangés avec ceux d'un autre système ou d'un autre fabricant. Ne mélangez pas de matériaux différents.
6. Toutes les instruments et et les pieces connexes doivent être nettoyés et stérilisés avant emploi. Des pièces stériles supplémentaires doivent être disponibles en cas de besoin imprévu.

DURANT L'INTERVENTION

1. Suivre attentivement tous les modes d'emploi.
2. Travailler toujours avec d'extrêmes précautions autour de la moelle épinière et des racines nerveuses. L'endommagement d'un nerf entraîne la perte de fonctions neurologiques.
3. Quand la configuration de l'os ne permet pas la mise en place d'un des dispositifs de fixation temporaires disponibles et que le modelage est absolument nécessaire, il est recommandé que ce modelage soit progressif et effectué avec beaucoup de soin afin d'éviter de créer des encoches ou de rayer la surface du ou des dispositifs. Les pièces ne doivent pas être recourbées de façon répétée ou plus que strictement nécessaire. Elles ne doivent pas être recourbées dans un sens puis dans l'autre au même endroit de manière répétée.
4. Ne pas rayer ni entamer la surface des implants, car ceci réduirait la résistance fonctionnelle de la construction.
5. Des greffons osseux doivent être mis en place à la zone à fusionner et le greffon devra enfin être mis en place à partir de la vertèbre supérieure à la vertèbre inférieure.
6. Ne pas utiliser de ciment osseux, car ce matériau rendrait difficile ou impossible le retrait des pièces. La chaleur générée par le séchage risque également de provoquer des lésions neurologiques et une nécrose osseuse.
7. Avant de refermer les tissus mous, s'assurer que toutes les vis sont bien vissées dans la plaque. En fin de serrage, vérifier une nouvelle fois qu'elles sont bien serrées, au cas où l'une des vis se serait desserrée durant le serrage des autres vis. Fixer aussi la vis d'arrêt de façon à couvrir la partie des têtes de vis situées de chaque côté de la plaque. L'omettre de le faire conduirait au desserrage des vis.

Attention : l'application d'un couple de serrage excessif risque d'entamer l'os et d'affaiblir la fixation.

APRÈS L'INTERVENTION

Les instructions postopératoires et les mises en garde données par le médecin au patient et l'observance de celles-ci par le patient sont d'une très grande importance.

1. Le patient doit recevoir des instructions détaillées sur l'utilisation et les limitations de l'implant. Si l'application d'une charge partielle est recommandée ou requise avant une consolidation osseuse ferme, le patient doit être averti du risque de recourbement, décollement, ou rupture des composants en cas de charge excessive ou trop précoce ou d'une activité musculaire excessive. Le risque d'un recourbement, d'une décollement ou d'une rupture du dispositif de fixation temporaire pendant la réadaptation postopératoire peut être accru si le patient est actif, ou si le patient est affaibli, atteint de démence ou autrement incapable de se déplacer avec des béquilles ou d'autres dispositifs de support de poids. Le patient doit être mis en garde contre les chutes ou les secousses soudaines en particulier.
2. Pour maximiser les chances de réussite de l'intervention, le patient et le dispositif ne doivent pas exposés à des vibrations mécaniques risquant d'affaiblir la solidité de la construction. Mettre le patient en garde contre cette éventualité et lui recommander de limiter la quantité et l'intensité de ses activités physiques, en particulier avec efforts de soulèvement et mouvements de torsion, et d'éviter toute activité sportive. Conseiller au patient de ne pas fumer ni consommer de l'alcool pendant la période de consolidation osseuse du greffon.
3. Le patient doit être informé de son incapacité à se courber au point de fusion rachidienne et on doit lui montrer comment compenser cette limitation permanente de mobilité du corps.
4. En cas de non-consolidation, ou de désolidarisation, de recourbement et/ou rupture des pièces, le ou les dispositifs doivent être révisés et/ou retirés immédiatement avant qu'une blessure grave ne survienne. Une consolidation d'une consolidation osseuse retardée ou non obtenue entraînera une fatigue excessive et répétée de l'implant. Ceci peut provoquer la défaillance par fatigue de l'implant, qui est souvent la conséquence d'une non-consolidation et/ou d'immobilisation du site d'intervention soit maintenue jusqu'à ce qu'une consolidation osseuse ferme ait été obtenue et de l'état confirmée par examen roentgénographique. Avertir suffisamment le patient de ces risques et le surveiller de près afin de réduire au minimum la possibilité d'incidents de ce type.

Les implants du système de plaques cervicales par voie antérieure Mecta-C sont des dispositifs de fixation interne temporaires. Ils sont conçus pour stabiliser la colonne antérieure pendant la période de développement d'une fusion osseuse. Une fois la colonne fusionnée, ils n'ont plus aucune utilité fonctionnelle et doivent être retirés. Chez la plupart des patients, un retrait est indiqué parce que les implants ne sont pas prévus pour transmettre ou supporter les forces importantes pendant de longues périodes sur un os normales. Si le dispositif n'est pas retiré à la fin de l'utilisation prévue, une ou plusieurs des complications suivantes peuvent se produire : (1) corrosion, avec réaction tissulaire localisée ou douleurs, (2) migration de l'implant pouvant entraîner des douleurs, (3) risque de lésion supplémentaire due au traumatisme postopératoire, (4) recourbement, désolidarisation ou/et rupture, rendant un retrait difficile ou impossible, (5) douleurs, gêne ou sensations anormales dues à la présence du dispositif, (6) augmentation possible de la courbure de la colonne vertébrale, perte de correction, de stature et/ou de réduction de la hauteur globale de la colonne vertébrale, (7) infection, (8) lésions durales, (9) fractures osseuses, (10) perte de fonction neurologique, y compris paralysie (totale ou partielle), dysesthésie, hyperesthésie, anesthésie, paresthésie, actifs. Toute déviation de la courbure normale de la colonne vertébrale, (11) perte de sphincter vésical ou intestinal ou d'autres troubles génito-urinaires, (12) formation de cicatrices risquant d'entraîner une compression nerveuse et/ou une douleur, (13) fracture osseuse, (14) interférence avec l'imagerie roentgénographique, CT et/ou RM due à la présence des implants, (15) fracture par fatigue et/ou désolidarisation et/ou rupture, (16) cessation de toute croissance potentielle de la partie opérée du rachis. Perte de la mobilité ou de la fonction rachidienne. Incapacité à effectuer les activités quotidiennes, (17) perte ou réduction de la densité osseuse, peut-être provoquée par la résorption ou la déviation des contraintes, (18) complications au site de prélèvement du greffon, y compris douleurs, fracture ou guérison difficile, (19) atélectasie, iléus, gastrite, hernie discale, greffon rétropulsé, (20) hémorragie, hématome, épanchement séreux, embolie, œdème, accident vasculaire cérébral, saignement excessif, phlébite, nécrose ou déhiscence de la plaie cutanée ou lésions des vaisseaux sanguins, (21) troubles du système génito-urinaire ou reproducteur, y compris stérilité et perte de consortium, (22) troubles développementaux chez l'enfant, y compris amputation, troubles de la croissance osseuse et/ou décès, (23) changement de l'état mental, (24) décès.

Une intervention chirurgicale supplémentaire peut être nécessaire pour corriger certains de ces effets indésirables anticipés.

MODE D'EMPLOI

CHOIX DE L'IMPLANT

Le choix d'un implant de taille, de forme et de modèle convenant au patient est essentiel au succès de l'intervention. Les implants chirurgicaux métalliques sont soumis à des contraintes répétées lors de leur utilisation et leur solidité est limitée par la nécessité de leur donner une taille et une forme adaptées à la morphologie osseuse humaine. À moins d'une sélection très rigoureuse des patients, d'un positionnement correct de l'implant et d'une prise en charge postopératoire visant à minimiser les contraintes sur l'implant, lesdites contraintes peuvent entraîner une fatigue du métal et être suivies d'une rupture, d'un recourbement ou d'une désolidarisation du dispositif avant la fin de la consolidation osseuse. Le recourbement, la rupture ou la désolidarisation peuvent nécessiter d'un retrait prématuré du dispositif.

FIXATION DE L'IMPLANT

La pose des implants et l'ajustement de leur position ne doivent être effectués que par des instruments auxiliaires spécifiques et avec le matériel fournis par MEDACTA. Pour la sécurité du patient, il est donc recommandé que les implants Medacta ne soient pas utilisés avec des implants d'une autre source.

AVANT L'INTERVENTION

1. Seuls les patients qui répondent aux critères décrits dans les indications d'emploi doivent être sélectionnés.
2. Les patients présentant les maladies et / ou les prédispositions décrites dans les contre-indications susmentionnées doivent être évités.
3. Les implants doivent être manipulés et stockés avec le plus grand soin. Ils ne doivent pas être rayés ni autrement endommagés. Les implants et les instruments doivent être protégés pendant le stockage, et en particulier de tout risque de corrosion.
4. La construction finale doit être déterminée avant l'intervention. Un choix suffisant de tailles d'implants doit être disponible durant l'intervention, y compris des tailles plus grandes et plus petites que celles prévues.

BIEDIGO GEBRAUCH

Die Komponenten der Mecta-C anteriorer halswirbelplatten System sind zur bedeckt voor anteriorer interbody schroef-/plaatfixatie van de halswervels tijdens de ontwikkeling van een halswervelfuse

PRODUCTOMSCHRIJVING

Het Mecta-C anteriorer halswirbelplatten systeem bestaat uit verschillende maten en vormen botplaten, schroeven en bijbehorende instrumenten. Fixatie wordt bereikt door middel van botschroeven die in het wervellichaam van de cervicale wervelkolom worden ingebracht via de voorzijde. De onderdelen van het Mecta-C anteriorer halswirbelplatten systeemimplantaat zijn gemaak

FIXEREN VAN HET IMPLANTAAT
Installeer en positioneer spanschroeven van implantaten mag alleen plaatsvinden met speciale bijgeleverde instrumenten en apparatuur die is geleverd en toegewezen door MEDACTA. Omwille van de veiligheid van de patiënt wordt het daarom aanbevolen MEDACTA-implantaten niet te gebruiken met implantaten afkomstig van andere bronnen.

PREOPERATIEF
1. Alleen patiënten die aan de criteria zoals omschreven in de indicaties voldoen mogen worden geselecteerd.
2. Patiëntcondities en/of gesteldheden zoals behandeld in de voorwaarden contra-indicaties dienen te worden vermeden.
3. Het hanteren en opslaan van de implantaatcomponenten dient met grote zorg te gebeuren. De implantaten mogen niet beknot of anderzins beschadigd raken. Implantaten en instrumenten dienen tijdens opslag niet samen te worden bewaard tegen corrosieve omgevingen.
4. Het type constructie dat voor het gewil in elkaar moet worden gezet, moet worden vastgesteld voordat met de operatie wordt begonnen. Er moet een bewerkstelligd dat implantaatcomponenten beschikbaar zijn tijdens de operatie, inclusief grotere en kleinere maten dan die welke waarschijnlijk gebruikt zullen worden.
5. Omdat er mechanische onderdelen worden gebruikt, dient de chirurg bekend te zijn met de verschillende onderdelen voordat hij de operatie begint. Het is belangrijk dat de chirurg bekend is met alle stappen in het verfijnen en vervolmaken van de verschillende implantaten en dat de implantaten aanwezig zijn voordat de operatie begint. De onderdelen niet van Medacta-C anterieure halswervelplaatsystemen dienen niet met onderdelen van Medacta-C anterieure halswervelplaatsystemen te worden gebruikt. Verschillende metaallypen mogen niet samen worden gebruikt.
6. Voor gebruik moeten alle instrumenten zorgvuldig worden gecontroleerd gereinigd en gesteriliseerd worde. Er moeten extra steriele onderdelen beschikbaar zijn ingeval van een onvoorziene behoefte.

INTRAOPERATIEF
1. Alle instructieaanbevelingen dienen zorgvuldig te worden opgevolgd.
2. Ronel het oogmerpunt van de operatie niet uit het oog verliezen voorzichtig te zijn. Beschadigingen aan de zenuwen hebben verlies van neurologische functies tot gevolg.
3. Wanneer de vulgingsmate van het type dat niet wordt gebruikt met een beschikbaar tijdelijk intern fixatieapparaat en contouren absoluut noodzakelijk is, dan wordt aanbevolen dat dergelijk contouren geleidelijk plaatsvinden en dat er zoer goed op wordt gelet dat het oppervlak niet wordt beschadigd. Het is belangrijk dat de contouren worden gecontroleerd voordat het definitief gebogen te worden dan absoluut noodzakelijk. De onderdelen mogen niet op hetzelfde punt worden teruggebogen.
4. De oppervlakken van het implantaat mogen niet beknot of gelaedeerd worden, omdat dergelijke defecten de functionele sterkte van de constructie kunnen verminderen.
5. Bottransplantates moeten in het te fuseren gebied worden geplaatst en de hechting moet worden uitgevoerd van de bovenste tot aan de onderste wervel zonder enige onderbreking.
6. Er mag geen botcement worden gebruikt, omdat dit materiaal verwijdering van de onderdelen moeilijk of onmogelijk zal maken. Bij gebruik van botcement kan de chirurg niet zeker zijn dat de onderdelen later tijde eenvoud worden verwijderd. Het botcement verzoeken.
7. Voordat de dachte weefsels worden gesloten, dienen alle schroeven in de plaat geschroefd te zijn. Controleer na voltooiing opnieuw hoe strak de schroeven zijn aangedraaid en of er geen los zijn gerakt tijdens het aandraaien van de andere schroeven. Deze dient de borgschroef te worden aangedraaid. Het is belangrijk dat de beenderen dat zich aan de uiteinden van de plaat bevindt. Wanneer dit wordt nagelaten, kunnen de schroeven loslaken.

Opgelet: Een te groot draaimoment op de schroefstanden kan ervoor zorgen dat de schroefdraden in het bot overbelasten, waardoor de fixatie ehenert.

POSTOPERATIEF
1. De postoperatieve aanwijzingen en waarschuwingen van de arts aan de patiënt en de bijbehorende gehoorzaamheid van de patiënt zijn van uitzonderlijk groot belang.
2. Er moeten gedetailleerde instructies over het gebruik en de begrenzingen van het apparaat aan de patiënt worden verstrekt. Indien gedeeltelijk dragen van gewicht wordt aanbevolen of vereist is voor het vormen van een botenheid, dan moet de patiënt worden gewaarschuwd dat bugten, loskraken of breken van de onderdelen zal optreden wanneer de patiënt te vroeg of te zwaar belast wordt. Het risico van bugten, loskraken of breken van een tijdelijk intern fixatieebeid gedurende postoperatieve rehabilitatie kan toenemen indien de patiënt actief is of wanneer de patiënt overgewicht, lijdt aan of verslaafd is aan drugs of alcohol. Wanneer gewichtsmeerdere maatregelen worden genomen om te gebruiken. De patiënt dient gewaarschuwd te zijn dat hij vallen of plotselinge sprongen in spinale positie moet vermijden.
3. Om de kansen op een succesvol uitgroeit resultaat te maximaliseren mag de patiënt of het apparaat niet worden blootgesteld aan mechanische trillingen die de constructie van het apparaat los kunnen maken. De patiënt dient ervoor gewaarschuwd te zijn dat dit mogelijk is en dat structures te krijgen om de fysieke activiteiten klein te houden en te beperken. De vorst tijdens de overgangsperiode wel soms tijdens de eerste weken na de operatie doorlopen. De patiënt moet hoofdzakelijk de aanwijzingen van de arts worden geïnformeerd over deze gevaren en onder nauwe controle staan, om medewerking te garanderen totdat de botvorming is bevestigd.
4. De MEDACTA-anterieure halswervelplaatsystemenstaan zijn tijdelijke interne fixatie implantaten. Interne fixatie implantaten zijn ontworpen om de fixeren tijdens het normale genezingsproces. Nadat de wervelkolom is gefuseerd, dienen deze apparaten geen functioneel doel meer en moeten ze worden verwijderd. Bij de meeste patiënten is verwijdering aanbevolen. Een implantaten niet bedoeld om zich in leven voor te dragen of de onderliggen fijtens normale activiteiten. Indien het apparat niet wordt verwijderd na volgen van zwoogt gebruik, dan kunnen één of meer van de volgende complicaties optreden: (1) Corrosie, met lokale reacties en het weefsel of (2). (2) Migratie van de prothese van implantaat met mogelijk verwondingen als gevolg. (3) Risico op extra verwondingen door een postoperatief trauma, (4) Blijven, loskraken en/of breken, wat verwijdering onpraktisch of moeilijk maakt. (5) Pijn, ongemak of abnormale gevoelens door aanwezigheid van het apparat. (6) Mogelijk toegenomen risico op infectie. (7) Botverlies door te weing belasting. Hoewel de chirurg de uiteindelijke beslissing moet nemen over verwijdering van het implantaat, is de Orthopedic Surgical Manufacturers Association. In mening dat wanneer het mogelijk en praktisch is voor de individuele patiënt, tijdelijke implantaten moeten worden verwijderd wanneer hun taak als hulpmiddel in genezing is vobracht, vooral bij jongere en actieves patiënten. Bij deze patiënten bestaat de kans dat de cuitaanse te verwijderen implantaten groter is dan de kans dat een tweede operatie en de moeilijkheidsgraad van de verwijdering in overwegng gemomen worden. Het verwijderen van het implantaat moet worden overwogen door bereikte postoperatieve controle, om breuken te voorkomen.
6. Alle verwijderde apparaten moeten zodanig worden behandeld dat hergebruik bij een volgende chirurgische procedure niet mogelijk is. Zoals bij alle orthopedische implantaten het geval is, mag geen van de onderdelen van het Medacta-C anterieure halswervelsplatsysteem ooit worden hergebruikt.

MEER INFORMATIE
Aanbevelen aangegeven voor gebruik van dit systeem (chirurgische operatieve technieken) zijn op aanvraag gratis beschikbaar. Indien u meer informatie behoeft of wenst, neem dan contact op met MEDACTA.

De referentietekst is de Engelse tekst. Laatst bijgewerkt: Augustus 2014

ESPANOL **Mecta-C - Sistema de placa cervical anterior - Instrucciones de uso**

GENERALIDADES
Antes de cualquier intervención quirúrgica, el cirujano debería estar familiarizado con las publicaciones comerciales y con la técnica quirúrgica, y deberá leer detenidamente estas instrucciones de uso. La selección del paciente es tan importante como la colocación y el posicionamiento del implante. La obesidad o los requisitos funcionales inapropiados pueden generar tensiones excesivas/es y reducir la vida útil del implante. Deberán localizarse las advertencias y seguirse al pie de la letra las instrucciones de uso.

USO PREVISTO
Los componentes del sistema de placa cervical anterior MectaC-e han diseñado para la fijación intercorporal anterior de la placa y los tornillos en la columna cervical durante el desarrollo de la fusión vertebral cervical

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El sistema de placa cervical anterior Mecta-C se compone de varias placas, tornillos o instrumental de distintas formas y tamaños para implantarse en distintas zonas. La fijación se realiza mediante tornillos roscados al hueso insertados en el cuerpo vertebral de la columna cervical desde la zona anterior. Los componentes de implante del sistema de placa cervical anterior Mecta-C están fabricados con aleación de titanio. No utilice los componentes del sistema de placa cervical anterior Mecta-C con piezas de otro sistema o fabricante. Todos los implantes son de un solo uso.

INDICACIONES DE USO
El sistema de placa Mecta-C se ha diseñado para la fijación intercorporal anterior de la placa y los tornillos de C2 a T1. El cirujano debe estar al corriente de las indicaciones y contraindicaciones del instrumental vertebral. El sistema está indicado para la estabilización temporal de la columna anterior durante el desarrollo de la fusión vertebral cervical en pacientes con: 1) enfermedad degenerativa de disco (diagnosticada por dolor en el cuello de origen discogénico con degeneración del disco, confirmada por el historial y por estudios radiográficos), 2) trauma (incluidas fracturas), 3) tumores, 4) deformidades (definidas como cifosis, lordosis o escoliosis), 5) pseudoartrosis y/o 6) fallo de fusión anterior.

Este sistema de dispositivo se ha diseñado únicamente para la fijación corporal intervertebral cervical anterior.

CONTRAINDICACIONES
Este dispositivo no está homologado para la fijación de tornillos en los elementos posteriores (pedículos) de la columna cervical, torácica o lumbar. Está contraindicado en los siguientes casos, entre otros:
1. Infección, localizada en la zona de operación.
2. Signos de inflamación localizada.
3. Fobre o leucocitosis.
4. Obesidad mórbida.
5. Embarazo.
6. Enfermedad mental.
7. Cualquier otra afección médica o quirúrgica que excluya cualquier posible beneficio de la cirugía de implantación en la columna, como la elevación de la velocidad de sedimentación que no se explica por la presencia de otras enfermedades, elevación del recuento leucocitario (RL) o una marcada desviación a la izquierda del recuento leucocitario diferencial.
8. Enfermedad arterial ateroesclerótica, aneurisma, osteoporosis grave. Enfermedad arterial, cirrosis hepática, obesidad mórbida, osteopenia u osteoporosis. Afección poco fiable/ el grado de corrección posible, el alcance de la fijación mecánica o la calidad del hueso.
9. Alergia o intolerancia a los metales sospechada o documentada.
10. Aquellos casos en que no sea posible conseguir una fijación adecuada con el hueso circundante.
11. Los casos que precisan combinaciones de metales de distintos componentes.
12. Pacientes que no deseen cumplimentar una cobertura tisular inadecuada sobre la zona corporal operativa o insuficiente densidad, calidad ósea o definición anatómica.
13. Cualquier caso que no figure en las indicaciones.
14. Pacientes que no estén dispuestos a seguir las indicaciones del postoperatorio.
15. Cualquier uso de un implante que interfiera con estructuras anatómicas o con el funcionamiento fisiológico previsto.

ADVERTENCIAS
No se logra un resultado satisfactorio en todos los casos quirúrgicos. Esto ocurre sobre todo en los casos de cirugía vertebral donde otras afecciones del paciente pueden comprometer los resultados. El sistema de placa cervical anterior Mecta-C es exclusivamente un dispositivo de fijación temporal. Dicha advertencia se aplica también a los componentes de injerto óseo, también para acelerar el desarrollo de la fusión vertebral mediante la estabilización temporal. Este dispositivo no está indicado para uso como soporte único de la columna vertebral. El injerto óseo debe estar incluido en los procedimientos de fusión anterior con los que se pretende utilizar el sistema de placa cervical anterior Mecta-C. El uso de este producto sin injerto óseo, o en casos en los que no se produzca una unión, no es efectivo. Este implante vertebral no puede soportar el peso del cuerpo sin un refuerzo óseo. En este caso, el dispositivo podría romperse, aflojarse, soltarse o romperse. Los problemas postoperatorios y quirúrgicos, como el oscurecimiento de las técnicas quirúrgicas y la selección y colocación correctas de los implantes, son considerablemente importantes para el éxito de la cirugía. Los pacientes deben ser informados de los riesgos anteriores. Además, la selección adecuada y el comportamiento del paciente afectarán en gran medida a los resultados. Se ha demostrado que la probabilidad de éxito en los pacientes fumadores. Es necesario advertir este hecho a los pacientes. Es necesario advertir este hecho a los pacientes y advertirles de las consecuencias. Los pacientes obesos, malnutridos o que consuman alcohol o drogas tampoco son buenos candidatos para la fusión vertebral. Tampoco son buenos candidatos los pacientes con una calidad muscular y ósea deficiente o parálisis nerviosa.

EFECTOS ADVERSOS POSIBLES
Pueden producirse efectos adversos cuando se utiliza el implante con o sin el instrumental asociado. Los eventos adversos potenciales incluyen, entre otros:
1. Alojamiento temporno o tardío de cualquiera de los componentes.
2. Desmoronamiento, rotura o flexión de cualquiera de los componentes.
3. Reacción de cuerpo extraño (alérgica) a los implantes, suciedad, corrosión de productos, material del injerto, que incluye una posible metalosis, manchas, formación tumoral, o enfermedad autoinmune.
4. La presión en la piel de partes de los componentes, que presentan una cobertura tisular inadecuada sobre la zona del implante puede causar penetración, irritación o dolor. Piel. Bursitis. Daño en el tejido provocado por una posición y colocación incorrectas del implante o el instrumental.
5. Cambio postoperatorio de la curvatura, pérdida de corrección, altura o reducción de la columna.
6. Infección.
7. Desgarro de la duramadre.
8. Pérdida de la función neurológica, incluida parálisis (completa o incompleta), disestesias, hiperestesia, anestesia, parestesia, aparición de radiculopatía, o desarrollo o persistencia del dolor, entumecimiento, neuroma o sensación de hormigueo.
9. Neuropatía, desórdenes neurológicos (pasajeros o permanentes), paraplejia bilateral, falta de reflejos o anormalidades.
10. Retención urinaria o pérdida del control urinario o tejidos de tratamiento urológico.
11. Formación de cicatrices que ocasionen posibilidades un trastorno neurológico alrededor de los nervios o dolor.
12. Fractura, movimiento, hundimiento o migración de cualquiera de los componentes del material vertebral o el injerto óseo, o de la zona de cultivo del injerto óseo en el nivel de la intervención, por encima, o por debajo del mismo.
13. Interferencia en imágenes radiológicas, CT o MRI debido a la presencia del implante.
14. Falta de unión (o pseudoartrosis). Retraso en la osificación. Mala unión.
15. Cesación de cualquier crecimiento postoperatorio de la zona ósea de la columna vertebral. Pérdida de movilidad o función de la columna vertebral. Incapacidad para realizar las actividades de la vida diaria normal.
16. Pérdida de masa ósea o disminución de la densidad ósea, debido posiblemente al efecto de relajación de tensiones (stress shielding).
17. Complicaciones en la zona de extracción del injerto, p.ej. dolores, fracturas o problemas de cicatrización de la herida.
18. Reblandecimiento, lesión, gastritis, núcleo pulposo herniado, rechazo del injerto.
19. Hemorragia, hematoma, seroma, embolia, edema, accidente cerebrovascular, hemorragia profusa, fiebre, necrosis de la herida, deficiencia de la herida o retraso en la cicatrización de la herida.
20. Trastornos gastrointestinales o del sistema reproductor, incluida la esterilidad o la pérdida de relaciones sexuales.
21. Desarrollo de problemas respiratorios, p.ej. embolia pulmonar, bronquitis, neumonía, etc.
22. Cambio del estado mental.
23. Muerte.

Puede ser necesaria cirugía adicional para corregir alguno de estos efectos adversos previstos.

INSTRUCCIONES DE USO

SELECCIÓN DEL IMPLANTE
La selección de la prótesis del tamaño, forma y diseño correctos para cada paciente es crucial para el éxito del procedimiento. Los implantes quirúrgicos mínimos están sujetos a tensiones repetidas durante el uso y su resistencia está limitada por la necesidad de adaptar el diseño al tamaño y la anatomía de los huesos humanos. Es muy importante que se tenga un gran cuidado en la selección del paciente. La colocación correcta del implante y la gestión postquirúrgica para minimizar las tensiones en el implante, y que tales tensiones pueden ocasionar fatiga del material y hacer que el implante se rompa, se doble o se afloje antes de completarse el proceso de curación, lo que podría resultar en una ulterior lesión o en la necesidad de retirar el implante prematuramente.

FIJACIÓN DEL IMPLANTE
La colocación y el ajuste posicional de los implantes deberá realizarse únicamente con instrumental auxiliar especial y con equipos suministrados y designados por MEDACTA. En interés de la seguridad del paciente, se recomienda, por tanto, no utilizar los implantes de MEDACTA con implantes de cualquier otra fuente.

PREQUIRÚRGICO
1. Sólo deben seleccionarse aquellos pacientes que cumplen con los criterios descritos en las indicaciones.
2. Deben evitarse las afecciones o predisposiciones de los pacientes como las mencionadas en las contraindicaciones explicadas anteriormente.
3. Debe tenerse cuidado al manipular y almacenar los componentes de los implantes. Los implantes no deben rayarse ni dañarse. Los implantes y el instrumental deben protegerse de la corrosión durante su almacenamiento, especialmente contra los entornos corrosivos.
4. El tipo de colocación de los implantes para el caso deberá determinarse antes de comenzar la cirugía. Deberá disponerse de un inventario adecuado de tamaños de implante en el momento de la intervención quirúrgica, incluidos tamaños más grandes y más pequeños que aquellos que se espera que se vayan a usar.
5. Debido al uso de piezas mecánicas, el cirujano debe estar familiarizado con los distintos componentes antes de utilizar los equipos y componentes. Es importante que el cirujano esté familiarizado con todos los pasos y el instrumental necesario antes de empezar la cirugía. No utilice los componentes de implante del sistema de placa cervical anterior Mecta-C con componentes de otros sistemas de placa cervical anterior Mecta-C.
6. Todos los instrumentos y relativos componentes deben limpiarse y esterilizarse antes de su uso. Deberán estar disponibles piezas adicionales esterilizadas en caso de cualquier necesidad inesperada.

INTRAQUIRÚRGICO
1. Deben seguirse al pie de la letra las instrucciones de los manuales.
2. En todo momento, deberá actuarse con extremo cuidado alrededor de la médula espinal y las raíces nerviosas. Los daños a los nervios pueden tener como resultado déficits neurológicos.
3. Si no es posible ajustar el dispositivo de fijación interna temporal disponible debido a la estructura del hueso, y es necesario modificarlo, se recomienda utilizar un dispositivo de fijación interna temporal diferente. No se recomienda doblar los componentes no deben doblarse repetida o excesivamente más de lo absolutamente necesario. Tampoco deben doblarse para volver a colocarlos en la misma posición.
4. Las superficies del implante no deberán rayarse ni marcarse, ya que podría verse reducida la resistencia y la funcionalidad del diseño.
5. Los injertos óseos deben colocarse en la zona de osificación, extendiendo el injerto desde la parte superior a la inferior de la vértebra que se va a osificar.
6. No debe utilizarse cemento óseo, ya que este material dificulta o impide la posterior retirada de los componentes. El calor generado durante el proceso de curado puede provocar también daños neurológicos y necrosis ósea.
7. Antes de cerrar los tejidos blandos, todos los tornillos deben estar fijados en la placa. Al finalizar, vuelva a comprobar la fijación de todos los tornillos para asegurarse de que no se hayan aflojado al apretar los otros. Compruebe también que el tornillo está correctamente fijado en la posición cubierta los casos de los cabezas en los extremos de la placa. Si no están bien colocados, los tornillos podrían aflojarse.

Atención: Un apriete excesivo de los roscas podrá hacer que estas se pasen y se reduzca la fijación.

POSTQUIRÚRGICO
Las instrucciones y advertencias postquirúrgicas del médico al paciente y el cumplimiento correspondiente del paciente son importantísimos.
1. Deberán darse al paciente instrucciones detalladas sobre el uso y las limitaciones del dispositivo. Si es necesario o se recomienda hacer descargo de carga de peso durante el proceso de curación, deberá advertirse al paciente que si no actúa de acuerdo a la forma de las implantes son complicaciones que pueden aparecer debido a una carga de peso excesiva o temprana, o una actividad muscular excesiva. El riesgo de que el dispositivo de fijación interna temporal se doble, se afloje o se rompa puede aumentar si el paciente es obeso, activo, o si no actúa de acuerdo a la forma de las instrucciones médicas, o es incapaz de utilizar muletas u otro mecanismo de soporte. Deberá advertirse al paciente que debe prevenir las caídas y las sacudidas perjudiciales durante el proceso de curación.
2. Para aumentar las posibilidades de éxito de la operación: ni el dispositivo ni el paciente deben exponerse a vibraciones mecánicas que puedan aflojar la construcción del implante. Deberá advertirse al paciente que debe evitar estas posibilidades y acostumbrarse a reducir las actividades físicas, principalmente los movimientos de levantamiento y los giros, y cualquier tipo de deporte. Deberá advertirse al paciente que debe evitar el estrés excesivo y el daño durante el proceso de fusión ósea.
3. Deberá informarse al paciente de la incapacidad de flexionarse en el punto de fusión vertebral y enseñarle a compensar esta restricción física permanente en el movimiento corporal.
4. Si no se observan signos de unión o de movimiento de los componentes, deberán revisarse o retirarse inmediatamente el dispositivo o dispositivos antes de que se produzca una lesión grave. Si no se innovitiva, la falta o el retraso de la unión se rompa o doble. Si se produce una rotura, deberá retirarse el dispositivo lo antes posible, ya que la dificultad del intentar la retirada el dispositivo se doble, se afloje o se rompa. Es importante mantener inmovilizada la zona de la columna operada hasta que se complete la unión ósea. Se deberá advertir al paciente que informe inmediatamente de cualquier cambio que note en el implante.
5. Los extremos afilados o rugosos del hueso o del tejido óseo circundante en dispositivo de fijación interna temporal. Los dispositivos de fijación interna están diseñados para estabilizar la zona operada durante el proceso normal de recuperación. Una vez consegida la fusión ósea de la columna, estos dispositivos no cumplen ninguna función y deben ser retirados. En algunos casos, aflojamiento o rotura, que podría dificultar o impedir la retirada. (b) Dolor, incomodidad o sensaciones anormales a causa de la presencia del dispositivo, (6) Posible aumento del riesgo de infección. y (7) Pérdida de masa ósea debido al efecto de relajación de tensiones (stress shielding). Si se retira el implante y no se vuelve a colocar, el paciente deberá ser advertido de que el hueso podría debilitarse y romperse. Los pacientes obesos, desnutridos, toxicodependientes y/o alcohólicos también más sólo son candidatos para fusión de columna. Pacientes con una calidad ósea o muscular deficiente y/o una parálisis nerviosa también más sólo son candidatos para fusión de columna.

POSSIBLES EFEITOS ADVERSOS
Podrán ocorrer efectos adversos cuando el implante é usado com ou sem a instrumentação cirúrgica associada. Os efeitos adversos potenciais incluem, entre outros:
1. Fracuddio precoce ou tardia de algum ou de todos os componentes.
2. Desmoronamento, curvatura ou fractura de algum dos todos os componentes.
3. Reacção aos implantes (reacção alérgica) a corpos estranhos, detritos, produtos de corrosão, material de enxerto, incluindo metalose, colorização, formação de tumores e/ou doenças auto-imunes.
4. Pressão sobre a pele, por partes dos componentes com uma cobertura de tecido inadequada sobre o implante, podendo causar penetração, irritação e/ou dor. Bursite. Lesões dos tecidos provocadas pelo posicionamento e colocação incorrectos do implante ou instrumento.
5. Alterações pós-operatórias na curvatura da coluna, perda de correcção, altura e/ou redução.
6. Infecção.
7. Lacerações dunas.
8. Perda da função neurológica, incluindo paralisia (completa ou parcial), disestesias, hiperestesia, anestesia, parestesia, aparência de radiculopatia, e/ou desenvolvimento ou continuação da dor, entorpecimento, neuroma ou sensação de formigueiro.
9. Neuropatia, défices neurológicos (transitórios ou permanentes), paraplegia bilateral, défices de reflexos e/ou anormalidade.
10. Perda de controlo intestinal e/ou da bexiga ou outros tipos de comprometimento do sistema urinário.
11. Formação de cicatrizes excessivas, que possam desencadear comprometimento neurológico e/ou dor nervosa e/ou dor.
12. Fractura, microfractura, reabsorção, danos, ou penetração de qualquer osseo da coluna ou/ou osseo no local de colheita do osso ilíaco, migração de qualquer componente ou material de enxerto ósseo.
13. Interferência com exames roentgenográficos, e imagens de TC e de RM devido a presença de implantes.
14. Não-união (ou pseudartrose). Atraso na consolidação. Má união.
15. Cessação de qualquer potencial crescimento da zona óssea da coluna. Perda de mobilidade ou função da coluna. Incapacidade para executar as actividades normais da vida quotidiana.
16. Perda de osso ou diminuição da densidade óssea, causada possivelmente pela defesa contra forças aplicadas (stress shielding).
17. As complicações no local doador do enxerto incluem dor, fractura ou problemas de cicatrização da ferida.
18. Amolecimento, lesão, gastrite, hérnia de disco, rejeição de enxerto.
19. Hemorragia, hematoma, seroma, embolia, edema, acidente vascular cerebral, hemorragia excessiva, flebite, necrose da ferida, deficiência da ferida ou lesões nos vasos sanguíneos.
20. Complicações gastrointestinais ou do sistema reprodutivo, incluindo esterilidade e perda de devenos conjugais.
21. Desenvolvimento de problemas respiratórios, por exemplo, embolia pulmonar, bronquite, pneumonia, etc.
22. Alteração no estado mental.
23. Morte.

El texto de referencia es el texto en idioma inglés. Última actualización: Agosto de 2014

PORTUGUES **Mecta-C - Sistema Placas Cervicais Anteriores – Instruções de Utilização**

GERAL
Antes de qualquer procedimento cirúrgico, o cirurgião tem de estar familiarizado com a documentação comercial e a técnica cirúrgica e deve ler atentamente estas instruções de utilização. A selecção dos pacientes é tão importante como a colocação e posicionamento do implante. A obesidade ou requisitos funcionais inadequados podem criar esforços excessivos/as e reduzir a vida útil do implante. Deve-se prestar atenção às advertências e as instruções de utilização devem ser observadas rigorosamente.

FINALIDADE PREVISTA
Os componentes do Sistema de Placas Cervicais Anteriores Mecta-C destinam-se à fixação da placa/parafuso intercorporal anterior da coluna cervical durante o desenvolvimento de uma fusão da coluna cervical

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Sistema de Placas Cervicais Anteriores Mecta-C é constituído por diversas formas e tamanhos de placas e parafusos ósseos, e instrumentos cirúrgicos para implantação em várias áreas. A fixação é realizada através de parafusos ósseos roscados por via anterior. Os componentes do implante do Sistema de Placas Cervicais Anteriores Mecta-C são fabricados de uma liga de titânio. Não use componentes do Sistema de Placas Cervicais Anteriores Mecta-C com componentes de outro sistema ou fabricante. Todos os implantes destinam-se a apenas uma única utilização.

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O sistema de placas Mecta-C destina-se à fixação da placa/parafuso intercorporal anterior da C2 a T1. As indicações e contra-indicações dos instrumentos vertebrais cervicais anteriores deverão ser devidamente compreendidas pelo cirurgião. O sistema deve ser utilizado para a estabilização temporária da coluna anterior durante o desenvolvimento de fusões da coluna cervical em pacientes com: 1) doença degenerativa do disco (diagnosticada com dor no pescoço de origem discogénica com degeneração do disco confirmada por história do doente e estudos radiográficos), 2) trauma (incluindo fracturas), 3) tumores, 4) deformidade (definida como cifose, lordose ou escoliose), 5) pseudoartroses e/ou 6) falhas anteriores mal-sucedidas.

O sistema de dispositivo destina-se a ser usado apenas em fusões do corpo intervertebral cervical anterior.

CONTRA-INDICAÇÕES
Este dispositivo não está aprovado para fixação de parafusos aos elementos posteriores (pedículos) da coluna cervical, torácica ou lombar. As contra-indicações incluem, entre outras:
1. Infecção local na área cirúrgica.
2. Sinais de inflamação local.
3. Febre ou leucocitose.
4. Obesidade mórbida.
5. Gravidez.
6. Doença mental.
7. Qualquer patologia médica ou cirúrgica que possa excluir o potencial benefício da cirurgia com implante espinhal, como a elevação da taxa de sedimentação não explicada por outras doenças, elevação da contagem de leucócitos (WBC) ou um desvio acentuado para a esquerda na contagem diferencial de leucócitos.
8. Doença arterial ou aterosclerótica grave, aneurisma, osteoporose. A osteoporose é uma contra-indicação relativa devido à sua capacidade pode limitar o grau de correcção adquirível, a quantidade de fixação mecânica ou a qualidade do enxerto ósseo.
9. Alergia ou intolerância ao metal suspeita ou documentada.
10. Qualquer caso que não necessite de fusão a enxerto ósseo ou onde não seja requerida a recuperação da fractura.
11. Qualquer caso que exija a utilização de combinações de metais de diferentes componentes.
12. Qualquer paciente com uma cobertura inadequada de tecido no local cirúrgico ou onde exista um volume ósseo, qualidade óssea ou definição anatómica inadequados.
13. Qualquer caso não descrito nas Indicações.
14. Qualquer paciente que não esteja disposto a seguir as instruções pós-operatórias.
15. Qualquer altura em que a utilização de implantes possa interferir com as estruturas anatómicas ou desempenho fisiológico previsto.

ADVERTÊNCIAS
Nem sempre se obtém um resultado bem-sucedido em todos os casos cirúrgicos. Isto é particularmente verdadeiro em procedimentos cirúrgicos da coluna onde muitas circunstâncias atenuantes podem comprometer os resultados. O Sistema de Placas Cervicais Anteriores Mecta-C destina-se apenas a ser utilizado para fixação temporária durante a fusão óssea. Este sistema também se destina a ser usado para aumentar o desenvolvimento de uma fusão da coluna. Este produto não se recomenda o seu uso como suporte único da coluna vertebral. O enxerto ósseo deve fazer parte dos procedimentos de fusão anterior para os quais se pretende utilizar o Sistema de Placas Cervicais Anteriores Mecta-C. A utilização deste produto sem um enxerto ósseo ou em casos em que não se desenvolva uma união, não será bem-sucedida. Este implante da coluna não pode suportar o peso do corpo sem reforço ósseo. Neste caso, o dispositivo poderá ceder, soltar-se, partir ou fracturar. Os problemas cirúrgicos e pós-operatórios, como a obscuridade das técnicas cirúrgicas e a selecção e colocação correctas dos implantes, são extremamente importantes para o sucesso da cirurgia. Os pacientes devem ser informados dos riscos anteriores. Além disso, a selecção e o comportamento do paciente afectarão em grande medida os resultados. Foi demonstrado que a probabilidade de sucesso nos pacientes fumadores é menor. Os pacientes devem ser informados deste facto. Os pacientes obesos, malnutridos ou que consumam álcool ou drogas também não são bons candidatos para a fusão vertebral. Também não são bons candidatos os pacientes com uma qualidade muscular e óssea deficiente ou paralisia nervosa.

EFEITOS ADVERSOS POSSÍVEIS
Podem ocorrer efeitos adversos quando se utiliza o implante com ou sem o instrumental associado. Os eventos adversos potenciais incluem, entre outros:
1. Afrouxamento temporno ou tardio de cualquiera de los componentes.
2. Desmoronamento, rotura o flexión de cualquiera de los componentes.
3. Reacción de cuerpo extraño (alérgica) a los implantes, suciedad, corrosión de productos, material del injerto, que incluye una posible metalosis, manchas, formación tumoral, o enfermedad autoinmune.
4. La presión en la piel de partes de los componentes, que presentan una cobertura tisular inadecuada sobre la zona del implante puede causar penetración, irritación o dolor. Piel. Bursitis. Daño en el tejido provocado por una posición y colocación incorrectas del implante o el instrumental.
5. Cambio postoperatorio de la curvatura, pérdida de corrección, altura o reducción de la columna.
6. Infección.
7. Desgarro de la duramadre.
8. Pérdida de la función neurológica, incluida parálisis (completa o incompleta), disestesias, hiperestesia, anestesia, parestesia, aparición de radiculopatía, o desarrollo o persistencia del dolor, entumecimiento, neuroma o sensación de hormigueo.
9. Neuropatía, desórdenes neurológicos (pasajeros o permanentes), paraplejia bilateral, falta de reflejos o anormalidades.
10. Retención urinaria o pérdida del control urinario o tejidos de tratamiento urológico.
11. Formación de cicatrices que ocasionen posibilidades un trastorno neurológico alrededor de los nervios o dolor.
12. Fractura, movimiento, hundimiento o migración de cualquiera de los componentes del material vertebral o el injerto óseo, o de la zona de cultivo del injerto óseo en el nivel de la intervención, por encima, o por debajo del mismo.
13. Interferencia en imágenes radiológicas, CT o MRI debido a la presencia del implante.
14. Falta de unión (o pseudoartrosis). Retraso en la osificación. Mala unión.
15. Cesación de cualquier crecimiento postoperatorio de la zona ósea de la columna vertebral. Pérdida de movilidad o función de la columna vertebral. Incapacidad para realizar las actividades de la vida diaria normal.
16. Pérdida de masa ósea o disminución de la densidad ósea, debido posiblemente al efecto de relajación de tensiones (stress shielding).
17. Complicaciones en la zona de extracción del injerto, p.ej. dolores, fracturas o problemas de cicatrización de la herida.
18. Reblandecimiento, lesión, gastritis, núcleo pulposo herniado, rechazo del injerto.
19. Hemorragia, hematoma, seroma, embolia, edema, accidente cerebrovascular, hemorragia profusa, fiebre, necrosis de la herida, deficiencia de la herida o retraso en la cicatrización de la herida.
20. Trastornos gastrointestinales o del sistema reproductor, incluida la esterilidad o la pérdida de relaciones sexuales.
21. Desarrollo de problemas respiratorios, p.ej. embolia pulmonar, bronquitis, neumonía, etc.
22. Cambio del estado mental.
23. Muerte.

Puede ser necesaria cirugía adicional para corregir alguno de estos efectos adversos previstos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

SELECÇÃO DO IMPLANTE
A selecção da prótese do tamanho, forma e design adequados do implante para cada paciente é fundamental para o sucesso do procedimento. Os implantes cirúrgicos metálicos são sujeitos a forças (stresses) quando em uso, e a sua resistência é limitada pela necessidade de adaptar o design ao tamanho e anatomia dos ossos humanos. É muito importante que se tenha muito cuidado na selecção do paciente. A colocação correcta do implante e a gestão pós-cirúrgica para minimizar as tensões em el implante, e que tales tensiones pueden ocasionar fatiga del material y hacer que el implante se rompa, se doble o se aflije antes de completarse el proceso de curación, lo que podría resultar en una ulterior lesión o en la necesidad de retirar el implante prematuramente.

FIXAÇÃO DO IMPLANTE
A colocação e qualquer ajuste posicional dos implantes deverá realizarse únicamente con instrumental auxiliar especial y con equipos suministrados y designados por MEDACTA. En interés de la seguridad del paciente, se recomienda, por tanto, no utilizar los implantes de MEDACTA con implantes de cualquier otra fuente.

PRÉ-OPERATÓRIO
1. Apenas devem ser seleccionados os pacientes que satisfazem os critérios descritos nas indicações.
2. Devem ser evitadas as condições ou predisposições dos pacientes como as mencionadas nas contra-indicações supracitadas.
3. Deverá ter-se cuidado ao manusear e armazenar os componentes dos implantes. Os implantes não devem ser riscados nem danificados de qualquer forma. Os implantes e instrumentos devem ser protegidos durante o armazenamento, especialmente contra ambientes corrosivos.
4. O tipo de conjunto a ser montado para o caso deve ser determinado antes do início da cirurgia. Deverá estar disponível um inventário adequado de tamanhos de implante durante a cirurgia, incluindo tamanhos maiores e menores que os que se prevêem utilizar.
5. Visto que estão envolvidas peças mecânicas, o cirurgião deverá familiarizar-se com os vários componentes antes de utilizar o equipamento, e deve montar pessoalmente os dispositivos para verificar que todas as peças e os instrumentos necessários se encontram disponíveis antes de começar a cirurgia. Não utilize os componentes do Sistema de Placas Cervicais Anteriores Mecta-C não devem ser combinados com componentes de outro fabricante. Não se deve usar diferentes tipos de metal conjuntamente.
6. Todos os instrumentos e relativos componentes devem ser limpos e esterilizados antes da sua utilização. Devem-se encontrar disponíveis componentes esterilizados suplementares no caso de serem inesperadamente necessários.

INTRA-OPERATÓRIO
1. Devem-se seguir todas as indicações subsidiárias quaisquer manuais de instruções.
2. Deve ser sempre aplicado um